



Apriete en cualquier parte para continuar

v.2012.2.00 v.24

Interdrugs:


Esta nueva herramienta permite al médico evacuar en segundos sus dudas sobre las interacciones farmacológicas entre los medicamentos que recibe y/o prescribirá a su paciente, mediante la búsqueda cruzada de múltiples principios activos.

La búsqueda de las interacciones farmacológicas se puede efectuar tanto por el nombre de la monodroga como por la marca de los medicamentos que se comercializan en la República Argentina.

El software le permite al médico en el mismo momento consultar las precauciones, contraindicaciones, y riesgo de

uso en el embarazo y lactante de los fármacos que utilizará en su paciente.

Además, puede realizar consultas de composición y presentaciones de los productos del Vademécum Argentino.



Esta es una imagen de la pantalla principal de Interdrugs, donde se ve el listado de las drogas y los principios activos.



Cuando presionamos sobre un PA o NC se despliega el siguiente menú donde seleccionaremos que acción queremos realizar.

IMPORTANTE. En caso de buscar un PA, si busca los nombres comerciales en primer lugar aparecerá el producto del Lab. Phoenix.

Carrier 2:05 PM 100%

Monodrogas y Nombres Registrados

Se buscarán interacciones entre los elementos siguientes

5-FLUOROURACILO®

6-COPIN®

8 HORAS®

8-MOP ULTRA®

8Y®

A ACIDO / A ACIDO EMOLIE...

3 TC COMPLEX®

6-COPIN®

8 HORAS®

Ver Interacciones Borrar Selección

1 interaccion(es) encontradas.

CLORPROMAZINA - HIOSCINA
(6-COPIN - 6-COPIN)

El uso simultáneo de antipsicóticos típicos (haloperidol, clorpromazina, trifluoperazina, tioridazina) con fuerte efecto anticolinérgico y alcaloides de la belladona y derivados (atropina, escopolamina, hioscina, propinox, N-butilbromuro de hioscina) puede incrementar la actividad anticolinérgica. Los pacientes pueden presentar constipación, retención urinaria, taquicardia, visión borrosa, midriasis, aumento de la presión intraocular, sedación, hipertermia. En casos graves se agrega ileo paralítico, delirio paranoide, excitación, psicosis, arritmias e hipertensión. Se recomienda evitar esta asociación, en caso de ser necesaria, monitorear la aparición de estos efectos adversos. Si se presentaran los efectos adversos graves se sugiere la internación del paciente y su atención inmediata.

MEDICAMENTOS
Rothlin

Una vez seleccionados los PC o NC de los cuales queremos ver la interacciones clickeamos sobre ver interacciones y automáticamente las vemos en la parte inferior de la pantalla.